


## Amfibieën en reptielen



Gezien in de buurt van Güzelçamlı (G), Ephese (E), Belevi (B), Tuzburgazı (T) of Kirazlı (K)

- Groene pad (*Bufo viridis*) (G)
- Boomkikker (*Hyla arborea*) alleen gehoord (G)
- Egeïsche meerkikker (*Pelophylax ridibundus*) (G, E, B)
- Balkanbeekschildpad (*Mauremys rivulata*) (G)
- Europese moerasschildpad (*Emys orbicularis*) (G)
- Moorse landschildpad (*Testudo graeca*) (G, E, B)
- Hardoen (*Laudakia stellio*) (G, E, B)
- Scheltopusik (*Pseudopus apodus*) (G)
- Anatolische berghagedis (*Anatololacerta anatolica*) (G)
- Oertzeni's berghagedis (*Anatololacerta oertzeni*) (G, E)
- Slangenooghagedis (*Ophisops elegans*) (K)
- Parelskink (*Chalcides ocellatus*) (K)
- Pijlslang (*Dolichophis jugularis*) alleen huiden (B)
- Dwergslang (*Eiernis modestus*) ook met schorpioen in bek (G, K)
- Ringslang (*Natrix natrix persa*) (T)
- Dobbelsteenslang (*Natrix tessellata*) (B)
- Klein Aziatische adder (*Montivipera xanthina*) (E)
- Slanke wormslang (*Typhlops vermicularis*) (K)

## **Zoogdieren waargenomen in de ruime omgeving van Güzelçamli (tussen Belevi en Tuzburgazi)**

Verkeerslachtoffer (V), cameraval (C), zicht (Z) en gehoord (H)

wild zwijn (*Sus scrofa*) (V, C, Z)

vos (*Vulpes vulpes*) (V, C)

das (*Meles meles*) (V)

oostelijke egel (*Erinaceus roumanicus*) (V)

Kaukasische eekhoorn (*Sciurus anomalus*) (V, Z)

steenmarter (*Martes foina*) (V, C, Z)

kleine bosmuis (*Sylvaemus microps*) (Z)

bosslaapmuis (*Dryomys nitedula*) (C)

gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) (Z, H)

? Amerikaanse nerts (*Neovison vison*) (Z)

Groet Geert Timmermans